

Avertissements agricoles

AVERTISSEMENT GRANDES CULTURES

destiné aux agriculteurs du Lauragais, de la Piège et du Razès
et rédigé en collaboration avec la ferme de Loudes et la Chambre d'Agriculture

N° 11 C DU 03/05/95

GRANDES CULTURES N° 4

BLES : Rouille brune – Oïdium : TRAITEZ
POIS : Couverture Fongicide – Insecticide

BLES

Le traitement Réal appliqué sur la semence a atteint sa limite d'efficacité (150 à 160 jours après le semis); ces céréales sont à considérer dorénavant au même titre que celles non traitées Réal


ROUILLE BRUNE : les pluies de la semaine dernière suivies de fortes chaleurs ont favorisé son développement

OIDIUM : au contraire ces mêmes pluies ont stoppé sa progression vers les étages supérieurs

SEPTORIOSE : assez discrète; ne progresse pas

PUCERONS : toujours présents sur la plupart des cultures

Les céréales n'ont plus que les 3 dernières feuilles encore vertes, il est d'autant plus important de les conserver en bon état et le plus longtemps possible



DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
ZAC D'ALCO B.P. 3056
34034 MONTPELLIER CEDEX 01
Tél.: 67.10.19.50 - Fax : 67.03.10.21

PUBLICATION PÉRIODIQUE
IMPRIMERIE DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON
LE DIRECTEUR M. FREYDIER - N° D'inscription 531 AD
ABONNEMENT ANNUEL - RÉGISSEUR DE RECETTES DE LA D.R.A.F.
C.C.P. MONTPELLIER 5238-12 G

* La majorité des blés sont au stade 10 (voir schémas) c'est à dire dernière feuille F1 bien étalée, barbes commençant à émerger de la gaine; vous êtes dans ce cas à environ 20 jours de la fin épiaison-début floraison. Si vous constatez la présence de Rouille brune sur l'une des 3 feuilles supérieures vous devez intervenir

* Certaines parcelles sont au stade 10.1, les premiers épis sont visibles

- si vous n'avez pas encore traité vous êtes à 12-15 jours du début floraison, vous devez intervenir le plus rapidement possible

- si vous avez déjà traité il y a 10-15 jours selon notre bulletin n° 3 du 12/04 attendez le stade épi commençant à fleurir pour renouveler votre application

Si vous constatez la présence de Pucerons sur tous les pieds de blés vous pouvez rajouter un insecticide

POIS

Les conditions météo, pluies et chaleur ensuite peuvent favoriser un développement de maladies, en particulier l'Anthracnose

Quelques pucerons sont visibles dans les boutons floraux

Réalisez une couverture fongicide et insecticide

(* couverture du risque Bruche sur la floraison)

- Blés au stade 10 à 10.1 non encore traités

- Rouille brune et oïdium sur F3-F2 ou F1

Intervenez en évitant les heures chaudes de la journée

PAINDOR	0.33	l/ha
+ Sandovit 0.5 l (bas volume moins de 200 l/ha)		
SPOT	1.5	l
OPUS	1	l

Réservez les spécialités Horizon, Caramba ou Libéro pour cette application

DECIS CE	0.3	l
KARATE	0.15	l
BAYTHROID	0.3	l
TALSTAR	0.075	l

Stade début floraison

CICERO/IMPACT TX	2	l/ha
ERIA	2	l
+ DECIS CE	0.25	l
KARATE	0.125	l
BAYTHROID	0.25	l (0.6 l *)
TALSTAR	0.075	l (0.2 l *)